



Bulletin technique des Chambres d'Agriculture du Bas-Rhin et du Haut-Rhin

N°30 du 13 novembre 2012 - 2 pages

GRANDES CULTURES

FLASH' CULTURES

BLE

Alors que certaines parcelles ne sont pas encore semées, les parcelles les plus avancées atteignent le stade 2-3 feuilles.

Désherbage

Dans les situations de semis précoces, les infestations sont souvent plus importantes. Cette année, on note effectivement des salissements parfois importants, en particulier en dicotylédones.



Si aucun traitement de prélevée n'a été réalisé, il est possible d'intervenir à partir de 2 feuilles. Ces traitements précoces permettent de détruire des adventices peu développées susceptibles de concurrencer la

BLE

Désherbage de post précoce

culture pendant le tallage et qui seront plus difficiles à gérer en sortie d'hiver. Ce désherbage précoce permet également de cibler les adventices présentes. Il est donc possible d'adapter au mieux les doses et les produits.

	Commentaires	Dose homologuée
Quartz GT / Legacy Duo / Puccini Gold, Quetzal	Produits quasi complets qui peuvent être suffisants en infestation moyenne.	2,4 l/ha
Lauréat / Carmina	Produits quasi complets qui peuvent être suffisants en infestation moyenne. Attention aux variétés sensibles au chlortoluron !	4,5 l/ha
Celtic	Insuffisant si matricaires et ray grass. Moyen sur gaillets.	2,5 l/ha
Trooper	Insuffisant sur gaillet, ombellifères.	2,5 l/ha

Produits de prélevée utilisables

Les associations utilisées en prélevée restent utilisables à des doses plus réduites (80 %), mais il est souvent plus intéressant de reconstituer un mélange adapté à base d'isoproturon ou de chlortoluron associé à un antidicotylédones.

Exemples :

- Isoproturon (ou chlortoluron) + Allié Express
- Isoproturon (ou chlortoluron) + Brennus Plus
- Isoproturon (ou chlortoluron) + Paréo

CHAMBRE D'AGRICULTURE BAS-RHIN : Alain WEISSENBERGER, Chef de Service
 Patrice DENIS - Laurent FRITZINGER - Jean Louis GALAIS - Pierre GEIST - Grégory LEMERCIER - Flavie MABON - Flora OGERON - Patrick ROHRBACHER
CHAMBRE D'AGRICULTURE HAUT-RHIN : Emmanuel MOLARD, Chef de Service
 François ALVES - Jonathan DAHMANI - Benoît GASSMANN - Nicolas JEANNIN - Alfred KLINGHAMMER - Hélène LE BAS

Chambre d'Agriculture du Bas-Rhin - 2 rue de Rome - BP 30 022 Schiltigheim - 67013 STRASBOURG CEDEX
 Chambre d'Agriculture du Haut-Rhin - 11 rue Jean Mermoz - BP 80038 - 68127 STE-CROIX-EN-PLAINE

Directeurs de publication : J.P. BASTIAN & L.WENDLINGER - ISSN : 2101-5406 - Toute reproduction même partielle est soumise à notre autorisation ©

Les Chambres d'Agriculture du Bas-Rhin et du Haut-Rhin sont agréées par le Ministère chargé de l'Agriculture pour leurs activités de conseil indépendant à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques sous les numéros d'agrément suivants :

AL 10832 pour la Chambre d'Agriculture du Bas-Rhin et AL 10833 pour la Chambre d'Agriculture du Haut-Rhin.

OPE.COS.ENR 8 - Version du 13-07-2012

D³

4° JO
43386

741

Isoproturon et parcelles drainées : les produits contenant de l'isoproturon seul ne sont pas utilisables lorsque les drains coulent. D'une manière générale, pour éviter un départ des produits (et une pollution du milieu), on évitera tout traitement en période de fort drainage.